

# Xevudy® (Sotrovimab)

## Hinweise zur Zwischenlagerung

Sotrovimab 500 mg Durchstechflaschen

- Durchstechflaschen sind bis zum Gebrauch im Kühlschrank bei 2°C bis 8°C zu lagern.
- Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um das Arzneimittel vor Licht zu schützen.
- Das Arzneimittel darf NICHT EINFRIEREN und NICHT GESCHÜTTELT werden.

Die Sotrovimab-Durchstechflaschen sollten **vor der Zubereitung** aus dem Kühlschrank entnommen und **etwa 15 Minuten auf Raumtemperatur** gebracht werden (nicht direkter Hitze aussetzen!).

Die zubereitete Infusion ist unmittelbar anzuwenden und darf nicht gelagert werden.

**Bitte vollständig ausfüllen – dient als Herstellungsdocumentation!**

Name Patient:	
Verwendetes Fertigarzneimittel:	<b>Xevudy® (Sotrovimab) 500 mg</b> Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung
Chargenbezeichnung:	
Zubereitungsdatum und Uhrzeit:	
Zubereitender (Name, Unterschrift):	
Verabreichungsdatum und Uhrzeit:	
Verordnender / freigebender Arzt (Name, Unterschrift):	
Anmerkung	Bitte machen Sie sich vor der Zubereitung mit der Fachinformation von Xevudy vertraut!

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Herstellung sorgfältig durch!

Benötigtes Material:

- 1x Sotrovimab 500 mg (62,5 mg/ml)
- 1x NaCl 0,9%-Beutel 100 ml
- 1x Spritze 10 ml
- 1x Kanüle (18G)
- 1x Infusionsbesteck
- 1x Inline-Filter



### Hinweise zur Zubereitung

1. Prüfen Sie die Ampullen visuell auf Partikel und Verfärbungen. Die Lösung ist klar bis leicht opaleszent und farblos bis gelb/braun.
2. Fläschchen vorsichtig per Hand schwenken. **Nicht schütteln!**
3. Desinfizieren Sie den Gummistopfen des Vials (Einwirkzeit des Desinfektionsmittels beachten!).
4. Entnehmen Sie 8 ml aus der Durchstechflasche mit Sotrovimab. (**Cave: Druckausgleich! Schaumbildung vermeiden!**) und spritzen diese langsam in den 100 ml NaCl 0,9% - Beutel.
5. Wenden Sie den Beutel vorsichtig, um ihn zu mischen. **Nicht schütteln!**
6. Schließen Sie das Infusionsbesteck nach Entfernen der Verschlusskappe an den **durchsichtigen** Infusionsport des Beutels an.
7. Verabreichen Sie die verdünnte Lösung als intravenöse Infusion **über den beigepackten 0,2 µm-Inline-Filter** mit einer **Infusionsrate von 200 ml/h** über **mind. 30 Minuten**. Bitte beachten Sie, dass aufgrund von Füllschwankungen der vorgefüllten Infusionsbeutel u.U. nicht exakt die deklarierte Menge enthalten ist.  
**Der Beutel sollte in jedem Fall komplett durchlaufen.**
8. Spülen Sie anschließend die Infusionsleitung mit mind. 25-50 ml NaCl 0,9% um zu verhindern, dass relevante Wirkstoffmengen in der Infusionsleitung verbleiben.

gemäß Produktinformation Xevudy (Sotrovimab) Stand 01/2022